

Process/aktivitet: Trygg och säker hälso- och sjukvård	Version: 1	Giltig fr.o.m: 2015-11-01	Ersätter:
Processägare: MAS	Processledare/ansvarig för revidering: MAS		Granskad av: Dokumentationsgruppen ssk
Beslutad av: MAS	Beslutad datum: 2015-10 -06	Revideras datum:	Värdegrundssäkrad ja/nej:
Användare/roll: Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, chefer			Intern/extern: Intern
Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg			Ärendenummer: Vv 385/2015 Vö 377/2015

Dokumentation Läkarkontakt

Samordning

Sökord Läkarkontakt

Alla kontakter med läkare som avhandlar en patientens vård ska dokumenteras under sökordet *Läkarkontakt*.

För att på ett strukturerat sätt kunna återge informationen som lämnats och erhållits kan frastexter användas för att stödja i både sätt att informera och dokumentera.

Följande information ska dokumenteras under läkarkontakt:

SAMORDNING

Läkarkontakt

Rond/Hembesök/Telefonkontakt:

För att kunna sortera i läkarkontakter inleds notaten med att dokumentera form för kontakt

Situation:

Orsak till kontakt

Bakgrund:

Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu

Aktuellt tillstånd:

Status/Beslutsstöd/Bedömning = sammanfattning av lämnad information och egen bedömning + frågeställning

Åtgärd:

Läkarens föreslagna åtgärder och rekommendationer, ev. hänvisning till vårdplan

Uppföljning:

Hur, när och vem som ska följa upp

Frastexter, orden ovan i kursiv stil, finns i Treserva.

Exempel 1.

Person med artros och ökad smärta som leder till immobilisering. Följande information finns i Treserva:

Medicinska diagnoser

Artros i vänster höft enligt epikris från avd 36 USÖ 2013-12-15

Sinnesfunktioner/smärta

Patienten besväras av smärta i vänster höft. I vila skattar hon sin smärta till NRS 3, vid belastning och rörelse mellan 5 och 7, se vårdplan smärta.

VÅRDPLAN Smärta:

Problem/bedömning

Smärta i vänster höft vid belastning pga artros. Har smärtbehandling regelbundet och vid behov.

Planerad åtgärd

Patienten säger till när hon har behov av extra smärtlindring. Smärtskattning med NRS ska göras vid varje tillfälle.

Utförd åtgärd

Efter middagsvilan ihållande smärta i vänster höft efter förflyttning från säng till rullstol. NRS 8 Får extra smärtlindring enl. ordination.

Upprepas flera gånger sista två veckorna

Uppföljning

Har sista två veckorna mer ont vid belastning. Fått extra smärtbehandling vid 7 tillfällen. Tas upp på rond på torsdag.

SAMVERKAN

Läkarkontakt

Rond: Anders Nilsson, hyrläkare som inte känner patienten

Situation: Ökad smärta i vänster höft – plågad patient - immobiliserad

Bakgrund: Artros i vänster höft, har smärtlindring för det sedan tidigare.

Aktuellt tillstånd: Mer ont sedan två veckor, uttrycker obehag vid varje förflyttning, ökad användning av vid behov, visar listan med givna vid behovsläkemedel

Åtgärd: Remiss till röntgen och ökad smärt behandling. Förskrivet i Pascal.

Uppföljning: Följs upp om två veckor på rond, fortsatt med smärtskattning som tidigare vid smärtgenombrott, se vårdplan Smärta.

Exempel 2

SAMVERKAN

Läkarkontakt

Rond: med Dr Ballester

Situation: Patient önskar vätskedrivande pga svullna ben.

Bakgrund: Är utred för hjärtsvikt när hon var på läkarbesök i februari och hon har ingen svikt.

Aktuellt tillstånd: Är svullen om benen på kvällarna

Åtgärd: Rekommenderas att använda stödstrumpor och sitta högt med benen, se arbetsplan kompressionsbehandling.

Uppföljning: På rond om en månad.

Exempel 3

SAMVERKAN

Läkarkontakt

Rond: med Dr Ekman

Situation: uppföljning efter slutenvårds vistelse USÖ

Bakgrund: Vårdats på USÖ och avd 93 orsak misstänkt magblödning

Aktuellt tillstånd: Blodtryck 115/60.

Åtgärd: Ordinerar nya blodprover bla Hb-värdet

Uppföljning: Bltr kontroll om 1 månad, återkoppla provsvar rond om en vecka.

Exempel 4

SAMVERKAN

Läkarkontakt

Telefonkontakt: Läkare Anders Svensson från Karla vårdcentral ringer

Situation: Urinodlingssvar klart

Bakgrund: Urinodling tagen pga misstanke UVI förra veckan

Aktuellt tillstånd: Odling visar växt av xxxxxx

Åtgärd: Behandling Selexid 200mg 2x2 i 3 dagar.

Uppföljning: ingen mer än att bevaka besvärsfrihet